

予防接種の間違いを防ぐためのポイント

各ステップで確認事項を明確に！




※各ステップでの確認のポイントは「予防接種における間違いを防ぐために(2019年改訂版)」をご覧ください

こんな時はとくに注意！

例えば・・・

兄(3歳、日本脳炎ワクチン)と
弟(1歳、MRワクチン)が
同時に予防接種を受けにきた



**兄弟・姉妹の同時受診時は
接種するワクチンを
間違えないように！**



**ワクチンを準備する時
ワクチンの種類や
有効期限を確認！**

ワクチンの取り扱いに注意！

掲示板

予防接種外来

水曜日の午前中
(要予約)



ワクチンは一度に
準備せず接種直前に！

接種量・接種方法に注意！

多くのワクチンは「1回に0.5mLを皮下接種」ですが
以下は接種量や接種方法を間違いやすいワクチンです

- DT2期 : 1回に**0.1mL**を皮下接種
- B型肝炎 : **10歳未満**は1回に**0.25mL**を皮下接種
- 日本脳炎1期 : **3歳未満**は1回に**0.25mL**を皮下接種
- インフルエンザ : **3歳未満**は1回に**0.25mL**を皮下接種
- BCG : 管針を用いて**2箇所**に圧刺（経皮接種）

接種器具の取り扱いに注意！



接種後は直ちに
専用の廃棄容器に！